UN NOUVEAU LAMIAIRE DE L'ILE EUROPA
(Col. Cerambycidae)

par Stephan BREUNING

Coptops (Trichocoptops n. subgen.) europae n. sp.

Antennes un peu plus longues que le corps (♂), le troisième article un peu plus long que le quatrième, aussi long que le scape. Lobes inférieurs des yeux sensiblement moins longs que les joues. Tête éparsément et très finement ponctuée. Pronotum peu densément et très finement ponctué, pourvu de chaque côté d'un tubercule latéro-inférieur antérieur conique et d'un tubercule latéro-supérieur prémédian conique, les deux à peu près de même longueur. Élytres très densément et finement ponctués sur la moitié antérieure, moins densément et très finement sur la moitié postérieure, chacun avec une bosse discale postbasilaire à peine accusée. Élytres garnis de poils dressés noirs assez courts. Fémurs et tibias garnis de poils dressés blancs assez longs.

Brun foncé, couvert de pubescence blanchâtre. Tout le corps, les fémurs et le scape parsemés de nombreuses très petites taches brun foncé. Articles antennaires à partir du troisième à pubescence brune, sauf au tiers basilaire et à l'apex.

Long. : 12 mm; larg. : 5 mm.

Type un ♂ de l'Ile Europa, IV-1961, leg. P. Malzy (Muséum, Paris).

Par la présence de poils dressés sur les élytres cette espèce diffère de toutes les autres espèces du genre et pourra former l'espèce type d'un nouveau sous-genre, pour lequel je propose le nom de *Trichocoptops* nov.

Source : MNHN, Paris